

LOES

1

De patiënt heeft:

- 1) Suïcidale gedachten (en/of)
- 2) Een suïcidepoging ondernomen

In gesprek gaan met de patiënt over diens suïcidaliteit m.b.v. **LOES**

2

3

Risicoformulering en vervolgtraject o.b.v. LOES

Zorg ervoor dat LOES ingevuld is in het EPD (i.f.v. de registratie van de gegevens)

4

5

Gebruik LOES bij doorverwijzing naar een andere hulpverlener



BASISBEVRAGING

1. Huidige poging (niet bij suïcidale gedachten)
2. Inschatting emoties
3. Aanwezigheid zelfmoordgedachten
4. Concrete plannen
5. Poging verleden
6. Zelfbeschadigend gedrag
7. Sociaal netwerk
8. Mate van hopeloosheid
9. Bereidheid tot verdere begeleiding

VERDERE VERKENNING

1. Aanwezigheid zelfmoordgedachten (indien >24u geleden bevraagd)
2. Concrete plannen
3. Verdere bevraging poging (niet bij suïcidale gedachten)
4. Motieven suïcidaliteit
5. Ambivalentie
6. Voorafgaande problemen
7. Middelengebruik
8. Behandelgeschiedenis
9. Coping
10. Toekomst
11. Zorgbehoeften aangegeven door de patiënt
12. Zorgtraject